

## SUGLASNOST KOJOM SE PRIHVAĆA / NE PRIHVAĆA CIRKUMCIZIJA

Ime i prezime pacijenta: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Adresa stanovanja: \_\_\_\_\_

MBO: \_\_\_\_\_

Ime i prezime, srodstvo, zakonskog zastupnika, odnosno skrbnika za pacijente koji nisu pri svijesti, za pacijente s težom duševnom smetnjom te za poslovno nesposobnog ili maloljetnog pacijenta: \_\_\_\_\_

### CIRKUMCIZIJA

**Cirkumcizija ili obrezivanje** je kirurški zahvat kojim se uklanja koža prepucija sa penisa. Pod lokalnom, regionalnom ili općom anestezijom koža prepucija se odvaja od glansa (glavića) penisa. Višak kože se odstranjuje, krvarenje se zaustavi, a preostala se koža sašije resorbirajućim koncem.

### DOBROBIT- RAZLOG VRŠENJA POSTUPKA

Sprječavanje uklještenja prepucija, sprječavanje upalnih kao i malignih bolesti prepucija, omogućavanje urednog mokrenja i spolnog akta.

### RIZICI KOD POSTUPKA

Ovdje su navedeni uobičajeni rizici. Osim toga mogu postojati i neki uobičajeni rjeđi rizici koji nisu ovdje navedeni. Ako imate bilo kakvih pitanja obratite se svom urologu. Ako je potrebna anestezija tijekom zahvata možete imati nuspojave zbog primijenjenih anestetika. Uobičajene nuspojave su osjećaj omamljenosti, mučnina, povraćanje, osip i opstipacija. Detaljnije informacije ćete dobiti od anesteziologa.

#### Specifični rizici:

- Krvarenje iz rane može se nastaviti i nakon operacije zbog čega je rijetko potrebna nova operacija.
- Moguć je podljev ili oticanje penisa koji nakon nekoliko dana spontano nestane.
- Moguća je infekcija rane zbog čega je ponekad potrebno uzimati antibiotike.
- Mogući su problemi s erekcijom.
- Moguće je da Vam se ne sviđa kozmetički učinak.
- Iznimno rijetko, vanjski otvor mokraćne cijevi može biti nenamjerno ozlijeđen tijekom operacije.
- Moguća je promjena u osjetu tijekom seksualnog odnosa.
- Svaka erekcija u postoperativnom razdoblju je bolna i može uzrokovati pucanje šava. Ukoliko se to dogodi šavi će se morati ponovno postaviti.

	<b>Prava pacijenta</b>	Oznaka dokumenta: OB-PP-SUG-CIRKUMC Vrijedi od: 10.10.2019. Stranica: 2 od 2
	<b>Suglasnost za cirkumciziju</b>	

Neki od gore navedenih rizika su češći u pušača, pretilih, dijabetičara, osoba sa povišenim krvnim tlakom i osoba sa bolesnim srcem.

## ZAMJENSKI POSTUPCI

Nema odgovarajućeg zamjenskog postupka.

Izjavljujem slobodnom voljom, utemeljenoj na potpunoj obaviještenosti o preporučenom dijagnostičkom/terapijskom postupku koji sam dobio/la u pisanom obliku isti postupak **prihvaćam**.

Potpis bolesnika/skrbnika: \_\_\_\_\_

Izjavljujem slobodnom voljom, utemeljenoj na potpunoj obaviještenosti o preporučenom dijagnostičkom/terapijskom postupku koji sam dobio/la u pisanom obliku isti postupak **ne prihvaćam**.

Potpis bolesnika/skrbnika: \_\_\_\_\_

Potpis i faksimil odgovornog doktora  
medicinske za obavljanje postupka \_\_\_\_\_

Našice, dana \_\_\_\_\_.